

CYCLAVANCE®

Tratamiento de la dermatitis atópica crónica en perros y gatos: Antiinflamatorio y Antiprurítico no esteroideo.
Oral

COMPOSICION:

Ciclosporina	100 mg
Vehículo c.b.p.	1 ml

PROPIEDADES:

Cyclavance® es una solución oral para el tratamiento de la dermatitis atópica. Previene y controla las manifestaciones crónicas de la dermatitis atópica en perros y de la dermatitis alérgica crónica en gatos.

Está diseñado para disminuir la reacción exacerbada del sistema inmune que caracteriza a los procesos crónicos de dermatitis atópica, especialmente inflamación y prurito.

Cyclavance® es ideal como alternativa al uso de corticoesteroides. Su efectividad está ligada a que disminuye la respuesta inmunitaria celular, inhibiendo la producción de anticuerpos T-dependientes. También inhibe la producción y liberación de citoquinas proinflamatorias. Es un fármaco de elevada potencia y alto nivel de seguridad.

Cyclavance® contiene ciclosporina de alto nivel, misma que está recomendada por el Grupo Internacional sobre DAC (Dermatitis Atópica Canina) para el tratamiento de perros atópicos, de tal manera que alivia los signos de prurito e inflamación en los pacientes y mantiene los efectos beneficiosos a largo plazo.

Al ser una fórmula líquida y palatable permite fácilmente una dosificación exacta y segura.

INDICACIONES:

- Tratamiento de manifestaciones crónicas de la dermatitis atópica en perros. Reduce la inflamación y prurito asociado con la dermatitis atópica.
- Tratamiento sintomático de dermatitis alérgica crónica en gatos.

DOSIS:

Perros: Administrar 0,05 ml de Cyclavance® por kg de peso (equivalente a 5 mg de ciclosporina/kg) 2 horas antes o después de la comida, diariamente hasta mejoría de los signos.

Gatos: Administrar 0,07 ml de Cyclavance® por kg de peso (equivalente a 7 mg de ciclosporina/kg) mezclado con el alimento o directamente en el hocico, diariamente hasta la mejoría de los signos.

Administrar por vía oral, inicialmente se debe administrar diariamente hasta la mejoría de los signos. Esto generalmente sucede en un plazo de 4 a 8 semanas. Si no existe mejoría durante las primeras 8 semanas, se debe suspender el tratamiento. Una vez que se han controlado satisfactoriamente los signos clínicos de la dermatitis atópica, Cyclavance® puede darse cada 2 días. Si los signos se controlan, el Médico Veterinario puede recomendar administrar Cyclavance® cada 3 a 4 días. Debe utilizarse la frecuencia de dosificación más baja para mantener la remisión de los signos clínicos.


La duración del tratamiento debe ajustarse a la respuesta del paciente. Se puede suspender el tratamiento cuando los signos hayan sido controlados. Si los signos reaparecen, se puede reanudar el tratamiento de una dosis diaria, en algunos casos serán necesarios varios ciclos de tratamiento.

*En gatos el prurito severo y prolongado puede inducir un estado de ansiedad y por consecuencia un acicalamiento excesivo. Si es el caso, aunque el prurito disminuya después de la administración del tratamiento, la resolución de la alopecia inducida puede retardarse.

RECOMENDACIONES Y MODO DE USO

El producto puede administrarse mezclado con el alimento o directamente en el hocico del animal. Si se administra con el alimento, la solución debe ser mezclada con una pequeña cantidad de alimento, preferiblemente después de un período de ayuno para asegurar el consumo completo. Si el gato no acepta el producto mezclado con el alimento, debe administrarse con jeringa directamente en el hocico del animal. Si el gato consume el alimento de forma parcial, la administración del producto con jeringa debe hacerse solamente hasta el día siguiente. Cualquier alimento parcialmente consumido, debe retirarse de forma inmediata y lavar el plato.

INSTRUCCIONES PARA UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN



- No lavar la jeringa entre usos, solo limpiar por fuera.

INTERACCIONES:

- Azoles: Como el Ketoconazol, incrementan la concentración sanguínea de Cyclavance, por lo que, se debe disminuir la dosis a la mitad.
- Macrólidos: Pueden incrementar la concentración sanguínea hasta en dos veces.
- Sulfa-trimetropim y Fenobarbital: Puede disminuir la eficacia de Cyclavance.
- La ciclosporina inhibe el transportador de la proteína P MRD1, por lo que, la administración con lactonas macrocíclicas (ivermectina y milbemicina) disminuyen su metabolismo y su excreción, pudiendo generar signos de intoxicación.
- El tratamiento con ciclosporina debe suspenderse dos semanas antes y dos semanas después del proceso vacunal.

REACCIONES ADVERSAS

En ocasiones se pueden presentar trastornos gastrointestinales tales como vómitos diarrea. Son leves y transitorias, generalmente no requieren la interrupción del tratamiento. Para más información consulte el inserto del producto.

PRECAUCIONES:

- No usar en casos de hipersensibilidad a la sustancia activa.
- No administrar a perros de menos de seis meses de edad o que pesen menos de 2 kg ni gatos que pesen menos de 2.3 kg, a reserva de la evaluación riesgo-beneficio del Médico Veterinario.
- No usar en pacientes con historial de trastornos malignos o trastornos malignos progresivos.
- No usar en gatos infectados con Virus de Leucemia Felina (FeLV) o Virus de Inmunodeficiencia Felina (FIV).
- No vacunar con vacunas vivas durante el tratamiento y hasta dos semanas antes y después del tratamiento.
- Consérvese a temperatura ambiente, fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- Una vez abierto, el producto es estable hasta 6 meses.

PRESENTACION:

Envase x 15 ml.

Envase x 50 ml.

REGISTRO SANITARIO AGROCALIDAD: RIP – 02 – FAR – 00228

ELABORADO POR: VIRBAC

DISTRIBUIDO POR: IMVAB CIA.LTDA.